

Bemerkenswerthe Chrysomeliden-Varietäten.

1. *Clytra nigrocincta* Lac. var. *deficiens* Heyd. *Elytris puncto solo humerali*. Cyprus.
 2. *Clytra atraphaxidis* Pall. var. *conjuncta* Heyd. *Elytris fascia postica communi, sutura nec interrupta*. Rumelia. Baku (O. Schneider).
 3. *Cryptocephalus ilicis* Oliv. var. *Blocki* (Dahl) Marsl. (typ. meae collectionis) non *Rossi* (qui = *bimaculatus* F.) = *etruscus* Weise. Da aber *Blocki* doppelte Anwendung fand, so hat die *ilicis*-Varietät den Namen *etruscus* Wse. zu führen. *C. bimaculatus* var. *bisbipustulatus* Suffr. hat den Namen *Blocki Rossi* zu führen.
 4. *Cryptoceph. globicollis* Suffr. Corpore toto *cyaneo* (loco viridi) = var. *cyaneomicans* Heyd. Basses Alpes, Vernet-les-Bains (Pyren. or.).
-

Bemerkungen zu Reitter: Neue Coleopteren aus Europa etc.
(Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, p. 17—36.)

1. Was ich Deutsche Ent. Zeitschr. 1888, p. 40, als *Zavaljus Fausti* Reitt. von Alai aufführte, ist *Triplax rubrica* Reitt., p. 21.
 2. *Aphyctus charopoides* Reitt., p. 27, von Taschkent = *picticollis* Heyd., D. E. Z. 1889, 328, von ebendaher.
 3. *Asclera flavipes* Reitt., p. 21, ist ♂ von *A. abdominalis* Heyd. (♀), D. E. Z. 1887, 300. Das ♀ hat ganz gelben (*ditute testaceo*) Bauch. Die Fühler sind an der Spitze gebräunt.
 4. *Callidium scabrum* Krtz. und *simplarium* Heyd. gehören, wie Reitter richtig vermutete, zur Gattung *Pronocera* Mot.
-

Kurze Notiz zu *Trichius v. rosaceus* Voët.
(Kraatz, Deutsche Ent. Zeitschr. 1891, 193.)

Diese Form ist bis jetzt bei Frankfurt a. Main noch nicht gefunden, ich besitze nur 2 Stücke als *gallicus* Dej. Italia (Mus. Ziegler) und aus Burgsteinfurt in Westfalen (de Rossi) als *gallicus* var. *Heydeni* de Rossi. — *Trichius abdominalis* Austria (Parreyss) meiner Sammlung (Krtz., p. 194) ist ein *gallicus*.

Dr. L. von Heyden.
